

Bemerkungen
zur
allgemeinen Narkose.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde
in der
Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe
unter dem Präsidium
des Herrn Geheimrath
PROF. RITTER VON NUSSBAUM
der
medizinischen Facultät
der
kgl. Ludwig-Maximilians-Universität München

vorgelegt von
JOSEF VOGL,
appr. Arzt aus Waging.

München, 1884.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Bemerkungen
zur
allgemeinen Narkose.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde
in der
Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe
unter dem Präsidium
des Herrn Geheimrath
PROF. RITTER VON NUSSBAUM
der
medizinischen Facultät
der
kgl. Ludwig-Maximilians-Universität München

vorgelegt von

JOSEF VOGL,
appr. Arzt aus Waging.

München, 1884.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

Das Bestreben, die Schmerzen bei chirurgischen Eingriffen aufzuheben oder zu mindern, ist uralt und findet sich bei allen Völkern und zu allen Zeiten.

Schon die alten Aegypter waren in der Zubereitung berauschender und anaesthetisirender Mittel, bei denen Cannabis indica und Opium die Hauptrolle spielen, wohl bewandert und, wenn sie statt des Glüheisens Moxen aus Hanf anwandten, so geschah dies wohl in der Absicht, damit der betäubende Rauch des indischen Hanfs die Schmerzen der Operation lindere.

Die Affyrer, schreibt Caspar Hoffmann, comprimirten bei Kindern, die der Operation der Beschneidung unterworfen werden sollten, die Halsgefäße, um sie dadurch gegen Schmerz unempfindlich zu machen.

Die Chinesen waren schon im 3. Jahrhunderte unserer Aera im Besitze anaesthetisirender Mittel. In einem zu Anfang des 16. Jahrhunderts publicirten chinesischen Werke, betitelt Kou-Kin-i-Tong (Sammlung alter und neuer Medicamente) fand Stanislaus Julien eine biographische Notiz über den chinesischen Arzt Moa-Tho, welcher in den Jahren 220—230 unserer Aera seinen Kranken, die operirt werden sollten, das Präparat Ma-yo (Cannabis indica) gab, durch welches sie gefühllos wurden.

Plinius secundus (32—79 n. Chr.) und Dioscorides pedanius (um 50 n. Chr.) erzählen vom Stein von Memphis, der gepulvert und mit Essig vermischt auf Körpertheile aufgelegt, die geschnitten oder gebrannt werden sollten, dieselben

für Schmerz unempfindlich mache. Litré nimmt an, daß dieser Stein von Memphis eine Art Marmor gewesen sei, der bei Zusatz von Essig Kohlensäure entwickelte, welche local anaesthetisirte.

Ein viel erwähntes Anaestheticum des Alterthums ist sodann die Mandragora oder Alraunwurzel (*Atropa mandragora* L.) schon den Griechen wohlbekannt, und wie Bodin constatirt, bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts als schlafserzeugendes und anaesthetisirendes Mittel vielfach verwendet. Dioscorides und sein Commentator Matthiolus berichten von solchen, welche die Mandragorawurzel mit Wein bis auf ein Drittheil des ursprünglichen Volums abkochen und bei Schlaflosigkeit, heftigen Schmerzen oder auch vor Operationen ein Glas voll dieser Abkochung nehmen lassen. Eine andere Art von Mandragora beschreibt Dioscorides als Morion, wovon er sagt, daß eine Drachme davon genommen Verlust des Bewußtseins und 3—4stündigen Schlaf zur Folge habe, und daß die Aerzte sich dieses Mittels bedienen, wenn sie schneiden oder brennen.

Auch im Mittelalter suchte man Anaesthetie bei Operationen herbeizuführen und zwar hier zum ersten Male durch Einathmung von Dämpfen. Dies entnehmen wir einem Berichte des Origenes aus einem Concil der englischen Kirche in Exeter vom Jahre 1287, worin es heißt: »Quando volunt medici incidere aliquos vel urere, dant eis bibere aliquem potum, qui facit eos profunde dormire, ita quod amentes fiant et sic non sentiant«, sowie der Chirurgio secundum medicationem Hugonis de Luca des Theodorich von Cervia, der ein Schüler Hugo's von Luca, Dominikaner, später Bischof 1298 in Bologna starb. Seine confectio soporis secundum dominum Hugonem, die er seine Kranken vor der Operation einathmen ließ, enthält hauptsächlich Schierling und den Saft der Mandragorablätter.

Heutzutage ist man nun darüber einig, daß alle in früherer Zeit gebräuchlichen Narcotika unseren gegenwärtigen zwei

wichtigsten Betäubungsmitteln in Bezug auf ihren praktischen Werth weit nachstehen; weshalb sie auch letzteren den Platz räumen mußten. Diese beiden Anaesthetica — der Aether und das Chloroform — erheischen daher eine ausführliche Besprechung.

Angaben aus früherer Zeit über Versuche eine locale oder eine allgemeine Anaesthese herbeizuführen, könnte man wohl genug zusammenstellen. Sie haben jedoch keinen anderen Werth als den, zu zeigen, daß das Bedürfnis und der Wunsch die Qualen schmerzhafter Operationen zu lindern, schon lange gefühlt und geäußert wurde und seit grauer Vorzeit die Köpfe der Aerzte bis auf unsere Tage vielfach beschäftigte. Der verfolgte Zweck wurde nie auch nur annähernd erreicht. Erst die Fortschritte der Chemie und ihre Verwendung in der Medizin am Ende des letzten und im Beginn des jetzigen Jahrhunderts brachte die Chirurgie dem Ideal der schmerzlosen Operation um einen großen Schritt näher. Priestly, der Entdecker des Sauerstoffs hatte schon 1765 die Inhalation dieses Gases zu therapeutischen Zwecken eingeführt.

Ihm folgten Andere auf gleichem Wege. Richard Pearson in Birmingham liefs im Jahre 1795 Kranke, die mit Lungenkrankheiten behaftet waren, wie es scheint, zur Beseitigung oder Milderung der Dyspnoë, Aetherdämpfe einathmen, indem er ihnen ein mit Aether gefülltes Gefäß oder ein mit Aether durchfeuchtetes Taschentuch unter die Nase hielt. Beddoes beschrieb die Versuche Thornton's, wonach Lungenkranke durch Aetherinhalationen von Schmerz und Opreßionsgefühl befreit wurden und eine Patientin mit schmerzhafter Mastitis durch Aetherinhalationen bis zur Bewußtlosigkeit aetherisirt wurde.

Um diese Zeit unternahm Humphry Davy mit großem Eifer seine Untersuchungen über die physiologische Wirkung des Stickstoffoxyduls (N_2O). Bei den zahlreichen Versuchen über die Wirkung dieses Gases, dem er wegen des heiteren

Deliriums, das seine Einathmung hervorruft, den Namen «Lachgas» gab, kam er auf den Gedanken, daß es wohl auch die Sensibilität zu beeinflussen im Stande wäre, und wirklich befreite er sich durch Inhalationen des Gases von Kopfschmerz und heftigem Zahnschmerz. Die Versuche Davy's wurden in England und auch auf dem Continent, wie es scheint, mit wechselndem Erfolge vielfach nachgemacht, ohne jedoch für die Medizin weiter ausgebeutet zu werden und fielen dann für viele Jahre wieder der Vergessenheit anheim.

Die Aetherinhalationen dagegen blieben, ohne noch für die Hervorrufung der Anaesthetie bei Operationen verwendet zu werden, dem Arzneischatz einverleibt. Warren und Woolcombe wandten sie im ersten Jahrzehnte dieses Säculums bei Phthisikern an. Anglada in Montpellier beseitigte neuralgische Schmerzen mit Aetherinhalationen.

Im Dictionnaire von Nyffen vom Jahre 1815 findet sich die Beschreibung eines Apparates für Anwendung von Aetherdämpfen und die Angabe, daß sie bei Kolikschmerzen gute Dienste geleistet hätten.

Faraday behauptet, daß die Inhalation von mit atmosphärischer Luft vermischten Aetherdämpfen ähnliche Wirkung habe, wie die Einathmung von Lachgas und erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der in Folge von Aetherinhalationen 30 Stunden bewusstlos und dem Tode nahe war.

In chemischen Laboratorien unterhielten sich die Studenten damit, Lachgas und Aetherdämpfe einzuathmen, bis Berausung oder Betäubung eingetreten war. Orfila machte Hunde, denen er Aether in den Magen brachte oder subcutan injicirte, gefühllos. Brodie und Giacomini constatirten ebenfalls die anaesthetisirende Wirkung des Aethers. Christison erwähnt eines jungen Mannes, der nach Einathmung von Aetherdämpfen in einen Zustand completer Bewusst- und Gefühllosigkeit gerathen war.

Aber alle diese Beobachtungen und Versuche blieben für

die Chirurgie ungenützt, die Brücke, welche die anaesthetisirende Wirkung des Stickstoffoxyduls und des Aethers mit der chirurgischen Operation verbinden sollte, mußte erst noch geschlagen werden.

Das Jahr 1844 endlich brachte die seit den Arbeiten Davy's und Faraday's in die Medizin eingebürgerte Idee, Operationen unter der Einwirkung anaesthetisirender Dämpfe vorzunehmen, der Realisirung näher. Horace Wells, Zahnarzt in Hartford, der in den Vorlesungen des Chemikers Colton die betäubende Wirkung des Stickstoffoxyduls kennen gelernt hatte, verlangte zum Zwecke einer Zahnextraction von Colton die Anwendung des Stickstoffoxyduls an sich selbst. Es geschah und Dr. Riggs zog den Zahn schmerzlos aus. Wells gab sich nun alle Mühe das Stickstoffoxydul in die zahnärztliche Praxis einzuführen, er machte etwa 12—15 schmerzlose Zahnextraktionen unter der Einwirkung des Gases, entschloß sich, seine Entdeckung weiteren Kreisen mitzuthemen und reiste deshalb 1845 nach Boston. Nach einem theilweisen Mißerfolg in der dortigen medizinischen Gesellschaft erlahmte seine Energie in der weiteren Verfolgung seines angestrebten Zieles, und sein Streben blieb erfolglos.

Ungefähr 2 Jahre später, nachdem schon in den Jahren 1842 und 1843 ein Arzt in Athen, W. C. Long, einige Operirte mit Aether narkotisirt hatte, ohne jedoch seine Beobachtungen der medizinischen Welt bekannt zu geben, wurde der Aether als chirurgisches Anaestheticum in die Medizin eingeführt. In das Verdienst dieser Einführung theilen sich die zwei Amerikaner Charles Jackson und W. T. G. Morton. Der Chemiker Jackson, angeregt durch die Arbeiten Davy's, studirte mehrere Jahre in seinem Laboratorium zu Boston die Wirkungen des Schwefeläthers.

Er ätherisirte sich selbst bis zur Bewusstlosigkeit und fand bei seinen Versuchen, daß der Aetherschlaf mit Unempfindlichkeit gegen Schmerz vergesellschaftet sei. Bei einer heftigen

Bronchitis, herbeigeführt durch unfreiwillige Chlorinhalationen, leisteten ihm die Aetherdämpfe treffliche Dienste. Jackson theilte nun im Jahre 1846 dem Zahnarzte Morton seine neue Entdeckung über die Wirkung des Aethers mit und veranlasste ihn ebenfalls zur Anwendung desselben bei seinen Kranken. Dies geschah auch und mit dem besten Erfolge.

Jackson, hievon benachrichtigt, überredete nun Morton, der unterdessen einen Inhalationsapparat construirt hatte, die anaesthetisirende Wirkung des Aethers auch bei einer großen Operation zu versuchen, worauf Morton sich an den Chirurgen des Massachusetts-Hospitals, Warren, wandte, welcher am 17. Oktober 1846 in Gegenwart mehrerer Aerzte einen Tumor des Halses unter Aethergebrauch entfernte. Drei Minuten nach Beginn der Inhalation war der Kranke unempfindlich, der Aether wurde beseitigt, und die Operation begonnen. Der Kranke, im Beginn derselben regungslos, zeigte im weiteren Verlauf Zeichen von Aufregung und gab nach dem Erwachen aus der Narkose an, einen kratzenden Schmerz am Halse gefühlt zu haben.

Anderen Tags, am 18. Oktober entfernte Hayward bei einer Frau einen Tumor am Arm. Diesmal wurde auf den Rath Morton's der Aether ohne Unterbrechung während der ganzen Operation angewendet. Die Kranke gab kein Schmerzenszeichen von sich, nur am Ende derselben war ein leises Stöhnen vernehmbar, das Patientin nicht mit Schmerzempfindung, sondern mit einem unangenehmen Traum in Verbindung brachte. Am 7. November wurde im gleichen Spital eine Unterkieferresektion mit wenig Schmerz, und am gleichen Tage eine Oberschenkelamputation vollkommen schmerzlos ausgeführt.

Und so war denn der Traum der Chirurgen, die schmerzlose Operation, zur Wirklichkeit geworden, und die Menschheit um eine der wichtigsten und segensreichsten Entdeckungen reicher.

Schnell verbreitete sich die große Nachricht von dieser epochemachenden Entdeckung schmerzloser Operationen durch Anwendung des Aethers nach Europa. Ein Brief Bigelow's an Francis Boott benachrichtigte die Engländer von der neuen Entdeckung, und am 19. Dezember 1846 machte Robinson eine schmerzlose Zahnextraction unter Anwendung von Aether, und schon am 20. Dezember führte der berühmte Liston einige Operationen, worunter eine Amputation, mit Aether aus, und nicht lange nachher wandte ihn Simpson bei geburtshülflichen Operationen an.

Am 22. Januar 1847 machte Malgaigne der kgl. Akademie der Medizin Mittheilung über mehrere ganz oder theilweise gelungene Aetherifikationen und nicht nur in der Akademie der Medizin, auch in der Akademie der Wissenschaften kam die neue Entdeckung zur Sprache und fand viele warme Vertheidiger.

In Deutschland hat Schuh die erste Operation — Exstirpation einer Telangiectasie — in Aether-Narkose gemacht am 27. Januar 1847. Ihm folgten Heyfelder, Rothmund, v. Bruns, Dieffenbach, Jüngken und Andere. Italien, Spanien, Rußland, Belgien, die Schweiz (Mayor in Lausanne) zögerten ebenfalls nicht, der Aetherifikation ihren Tribut zu zollen.

Aber auch die Physiologie beschäftigte sich mit dem neuen Anästhetikum und die Arbeiten von Magendie, Serres, Gruby, Sonnet, Flourens in Frankreich, von Snow in England dienten wesentlich dazu, die Aetherfrage aufzuklären, zu vervollständigen und fruchtbringend zu machen.

Aber nicht lange sollte der Aether sich seines Triumphes freuen, denn schon im November 1847 beschenkte Simpson die Chirurgie mit dem mächtigen Rivalen des Aethers, mit dem Chloroform, das nicht nur den Aether, sondern auch alle

zur selben Zeit oder später entdeckten und angewandten Anaesthetica in den Hintergrund drängen sollte.

Von Soubéiran 1831 zu Paris entdeckt, von Liebig, Dumas und Guthrie näher untersucht, wurde es schon 1831 von Ives in Newhaven bei Krankheiten der Respirationsorgane erfolgreich angewendet, im Jahre 1838 verschrieb es Formby bei Hysterie, 1844 benützte es Tufon in London bei der Behandlung des Krebses und bei Neuralgien, und im gleichen Jahre empfahl es Guillot in Paris als Mittel gegen Asthma.

Am 8. März 1847 theilte Flourens der Académie des sciences seine Untersuchungen über die physiologische Wirkung des Chloroforms an Thieren mit, durch welche er nachwies, daß die anaesthetisirende Wirkung des Chloroforms viel rascher und angenehmer ist, als diejenige des Aethers. Allein weder die Flourens'schen Experimente, noch einige gelungene Narcosen eines Londoner Arztes Namens Bell am Middlesex-Hospital mittelst einer Lösung von Chloroform in Spiritus bei chirurgischen Operationen am Menschen i. J. 1847 waren im Stande, die Aufmerksamkeit der Aerzte auf sich zu lenken, wahrscheinlich weil weder Flourens noch Bell großen Werth auf ihre Beobachtungen legten und sich nicht weiter mit dem einmal angeregten Gegenstand beschäftigten.

Am 10. November 1847 legte nun J. G. Simpson der medicinisch-chirurgischen Gesellschaft in Edingburgh seine Epoche machende Arbeit über ein neues Anaestheticum, das Chloroform vor, worin er an der Hand von einigen 80 Beobachtungen an chirurgischen Kranken und Gebärenden die Vortheile der Chloroformnarcose im Gegensatz zur Aethernarcose auseinandersetzte und besonders darauf hinwies, daß das Chloroform schneller, vollständiger und andauernder wirke, als der Aether, daß die Einathmung des Chloroform angenehmer sei, als die des Aethers und weniger Nachleiden erzeuge, daß Chloroform in viel geringerer Quantität einge-

athmet werden müsse, und seine Anwendung daher auch weniger kostspielig sei, und dass endlich die Chloroforminhalationen keinen Apparat und kein Instrument benöthigen. Die unleugbar vorhandenen unangenehmen Eigenschaften des Aethers als Anaestheticum hatten Simpson veranlaßt, nach einem anderen Anaestheticum zu suchen.

Simpson experimentirte mit Salpetersäureäther, Aceton, Liquor hollandicus, Benzin etc. und kam schliesslich, auf den Rath von Dr. Waldie, auch zur Prüfung des Chloroforms, das allen seinen Erwartungen an ein kräftiges und angenehmes Anaestheticum entsprach.

Mit außerordentlicher Geschwindigkeit, den Aether überall verdrängend, machte das Chloroform seinen Siegeslauf durch die ganze civilisirte Welt. Einige Todesfälle, die kurze Zeit nach Einführung des Chloroforms bei dessen Anwendung vorkamen, mäfsigten jedoch bald wieder den ersten Enthusiasmus und mahnten zur Vorsicht. Gerade diese Unglücksfälle, die mit der ausgedehnteren Anwendung des Chloroforms immer häufiger wurden, sind ohne Zweifel auch die Veranlassung dazu gewesen, daß seit der Einführung des Chloroforms in die ärztliche Praxis bis auf den heutigen Tag immerfort neue Anaesthetica aufgesucht und geprüft wurden.

Fast jedes Jahr bereicherte die Medizin um einige neue Anaesthetica, bis endlich i. J. 1867 durch Richardson 2 neue Anaesthetica in die Chirurgie eingeführt wurden: der Methylaether und das Methylenbichlorid, von denen das letztere das einzige von den vielen, bis auf den heutigen Tag Anhänger und Anwender sich zu verschaffen und zu erhalten wußte. Alle übrigen aufgetauchten Anaesthetica sind nach kurzer Zeit oder selbst nach wenigen Versuchen wieder der Vergessenheit anheimgefallen, und jetzt noch beherrschen diese beiden Hauptmittel — Aether und Chloroform — die chirurgische Anaesthetik.

Obwohl nun Anfangs das Chloroform den Aether fast vollständig und in kurzer Zeit verdrängte, blieben vereinzelte

Chirurgen, zufrieden mit den Leistungen des Aethers und in Bezug auf die Chloroform-Anwendung ängstlich geworden durch die sich mehrenden Chloroformtodesfälle, dem Aether treu, und es sind namentlich 2 Städte: Lyon und Boston, welche vom Jahre 1847 bis auf heute in der Mehrzahl ihrer Chirurgen das Chloroform proscribirten und mit grossem Eifer und Geschick der ausschliesslichen Anwendung des Aethers das Wort redeten. Schon i. J. 1849 eröffneten Diday und Pétrequin den Feldzug gegen das Chloroform und erklärten dasselbe auf Grund zahlreicher in Lyon beobachteter Todesfälle als ein gefährlich wirkendes Gift. Rodet in Lyon, Catu in Turin und Andere schlossen sich ihnen an.

Der Chloroformtodesfall von Gorré in Boulogne sur mer gab die Veranlassung dazu, daß die Pariser Académie de méd. sich des Gegenstandes bemächtigte. Malgaigne stellte diesen Todesfall unter die plötzlichen Todesfälle bei Operationen aus unbekannter Ursache, und die Académie stellte, allerdings unter Opposition einiger Mitglieder, den Satz auf, daß das Chloroform bei Beobachtung gewisser Vorichtsmafsregeln ganz ungefährlich sei.

Unterdeffen war es den unausgesetzten Bemühungen Pétrequin's, der in seiner Clinique chirurg. de l'Hôtel Dieu de Lyon den Aether neuerdings für ein ungefährliches Agens erklärte, gelungen, die bedeutenderen Aerzte in Lyon für den Aether zu gewinnen.

Seit 1853 war auch in Boston das Chloroform wieder verlassen worden, und an seine Stelle der Aether getreten. Lee in Irland wollte 1854 das Chloroform aus der Geburtshilfe verbannt wissen, und Lizars erklärte, daß das Chloroform in Edingburgh Gegenstand allgemeiner Abneigung geworden sei.

Im Krimfeldzuge wurde nach Baudens laut seinen Mittheilungen an die Académie des sciences vom 12. Dezember 1855 in der sardinischen Armee nur Aether angewendet. In

Paris dagegen behauptete das Chloroform seine alleinige Herrschaft, obwohl Velpéau vor den Gerichten erklärt hatte, daß das Chloroform auch bei Anwendung aller Vorichtsmafsregeln den Tod herbeiführen könne.

Am 10. März 1859 erklärte die Société de chirurgie de Paris, daß der Aether das Chloroform nicht ersetzen könne, weil er eine stürmische Narcofe mache, die Muskeln nicht relaxire, und wenn man die Narcofe bis zur Muskelrelaxation fortsetze, das Leben gefährde.

Damit keineswegs einverstanden, erklärte die Société de méd. de Lyon am 28. März 1859 den Aether für ungefährlich und die Aethernarkose für ebenso vollständig und tief, wie die Chloroform-Narcofe.

Einige Pariser Aerzte, erschreckt durch einen neuen Todesfall in Paris, sprachen sich 1859 ebenfalls gegen das Chloroform aus. Durch Palasciano, der sich einige Zeit in Lyon aufgehalten hatte, fand die Aetherifation in Neapel Eingang, und Bonnet wurde in diese Stadt berufen, um mit Hülfe des rectificirten Lyoner Aethers daselbst zu operiren.

In den Jahren 1866 und 1867 erschienen neuerdings zwei Abhandlungen Pétrequin's gegen das Chloroform und für den Aether, worin als wesentliches Moment gegen die Chloroformanwendung namentlich hervorgehoben wurde, daß in den 14 Jahren, in denen man in Lyon fast ausschließlich Aether angewendet, kein einziger Todesfall unter seinem Gebrauche beobachtet worden sei.

Velpéau erklärte hierauf, daß er immer nur mit Chloroform operire und noch keinen Kranken verloren habe, daß man beide Anaesthetica benützen und ihre Anwendungsweise vervollkommen müsse, und Sédillot sprach sich ebenfalls im Hinblick auf die Auseinandersetzungen Pétrequin's abermals zu Gunsten des Chloroforms aus.

Noch im Sommer 1867 veröffentlichte Laroyenne in Lyon einen während der Aetherifation vorgekommenen Todes-

fall, und bald darauf berichtete Gay et über weitere 6 Aethertodesfälle, und wenn auch bei einem Theil derselben bei genauer Analyse der Aether von der Schuld am Tode freigesprochen werden muß, so kam doch durch diese Thatfache allein der Aether wieder in eine Art von Mifscredit. Die nachträgliche Erklärung der Lyonefer medicinischen Gesellschaft, daß der Aether trotzdem weit weniger gefährlich sei, als das Chloroform und nie so blitzschnell tödte, wie jenes, machte keinen Eindruck mehr und widerlegte nicht das Factum, daß auch der Aether kein ungefährliches Agens ist, und so hat dann auch, trotz Pétrequin und der Lyonefer-Schule, in Frankreich der Aether das Chloroform nicht verdrängen können.

In Amerika war der Aether, abgesehen von Boston, wo er fast ausschließlich angewendet wurde, seit seiner Einführung in die medicinische Praxis als Anästheticum nie vollständig bei Seite gesetzt worden und wurde neben Chloroform immer angewendet. So wurden z. B. im Rebellionskriege von 23260 Operationen 60% in der Chloroform-, 30% in der Aether-Narkose und 10% unter Anwendung gemischter Dämpfe vorgenommen. Nach dem Jahresbericht über das Marine-Hospital der vereinigten Staaten vom Jahre 1874 betrug die Anwendung des Chloroforms 52%, des Aethers 35% und einer Mischung von Chloroform und Aether 13%.

In Großbritannien dagegen war bis Anfang der 70er Jahre der Aether fast ganz außer Gebrauch gekommen und durch das Chloroform verdrängt worden und nur wenige Chirurgen wie Thomas, Jones, Haward etc. in England und J. Morgan in Irland ätherisirten ihre Kranken. Da vollzog sich auch in diesem Lande ziemlich rasch und unerwartet ein vollständiger Umschwung zu Gunsten des Aethers. Zwei Momente bedingten ihn hauptsächlich, einmal die in erschreckender Weise zunehmenden Chloroformtodfälle, sodann die Bemühungen des Dr. Joy Jeffries von Boston, der beim

ophthalmologifchen Congrefs in London am 1. Auguft 1872 die Anwendung des Aethers nach einer einfachen Methode und feine prompte Wirkung den englifchen Aerzten ad oculos demonftrirte und fie in eindringlicher Weife aufforderte, dem Beifpiel der Amerikaner folgend, zum Aether, dem ficherer Anaestheticum überzugehen.

Und auch in neuerer Zeit wird in vielen Spitälern Londons mit Vorliebe Aether angewendet, doch nicht ausschließlic, infoferne für kurze und leichte Operationen häufig mit Stickstoffoxydul anäthefirt und bei Kindern, fowie bei Operationen im Geficht noch immer Chloroform verwendet wird.

Aber auch in anderen Städten Englands wie z. B. in Liverpool, in Birmingham, auch in Schottland, (Keith, Edingburgh) hat fich der Aether bereits wieder eingebürgert.

Nicht weniger als klinifche Erfahrungen mag auch der Wiedereinführung des Aethers der Umftand förderlich gewesen fein, dafs schon das englifche Chloroformcomité auf Grund von Thierexperimenten fich für die geringere Gefährlichkeit des Aethers ausgesprochen hatte und dafs neuerdings Phyfiologen von Fach, wie namentlich Schiff, dem Aether den Preis der relativen Sicherheit zuerkannten.

In Deutschland wird faft ausschließlic chloroformirt. In Oefterreich ift auch Billroth zu der dafelbft viel angewendeten Mifchung von Chloroform, Alkohol und Aether übergegangen. In der Schweiz wird von Prof. Schiff im Kantonsfpital Genf mit gutem Erfolge ätherifirt.

Ueber andere Länder liegen nach diefer Richtung keine zuverlässigen Berichte vor. Die Wiedereinführung des Aethers in England hatte zur Folge, dafs die Methode der Aetherifation in ganz erheblicher und bedeutungsvoller Weife verbessert wurde.

Der Beweis, dafs die Aether-Narkofe bedeutend weniger Gefahren in fich fchließte, als die Chloroformnarkofe ift noch keineswegs erbracht worden. Seit der Wiedereinführung des

Aethers in England ist, ganz abgesehen von allen früheren, schon eine bedeutende Anzahl von Aethertodesfällen registriert worden und zwar von solchen, wo der Aether mit vollem Rechte als Todesursache beschuldigt werden darf und die nöthige Vorsicht nicht außer Acht gelassen wurde. Um den Schmerz einer chirurgischen Operation zu beseitigen, hat man von jeher zwei Wege eingeschlagen.

Man hat entweder die Unempfindlichkeit des ganzen Körpers herbeizuführen gesucht und damit auch in der Regel eine mehr minder vollständige Aufhebung des Bewußtseins erreicht — allgemeine Anaesthesia — oder man hat nur einen Theil des Körpers, an welchem eine Operation vorgenommen werden sollte, unempfindlich zu machen gesucht — locale Anaesthesia.

Wir wollen nun die allgemeine Anaesthesia und zwar vorerst jene durch Chloroform herbeigeführte etwas näher betrachten, dann jene mit Schwefeläther und Stickstoffoxydulal.

I.

Allgemeine Anaesthesia durch Chloroform.

Chloroform = Formyltrichlorür = Trichlormethan = CHCl_3 .

Schon beim ersten Eindringen der Chloroformdämpfe in Mund und Nase empfindet der Chloroformirte einen süßlichen Geschmack und ein Gefühl von Kühle und Frische in Mund und Nase. Fast regelmäfsig hat derselbe schon bei den ersten Inhalationen, namentlich wenn ihm Tuch oder Apparat sehr nahe vor Mund und Nase gehalten werden, ein höchst lästiges Erstickungs-Gefühl.

Frägt man in der Zeit des noch erhaltenen Bewußtseins die Chloroformirten nach ihrem Befinden, so erhält man gewöhnlich die Antwort, es sei ihnen wohl und leicht zu Muthe, zuweilen so leicht, „als ob sie fliegen könnten“, dem entsprechend ist auch die Stimmung heiter, viele lachen leise oder laut vor sich hin.

Nach weiteren Inhalationen umnebeln sich die Sinne, das Auge sieht wie durch einen dünnen Schleier, lautgesprochene Worte der Umstehenden tönen wie aus weiter Ferne, zunehmender Schwindel stellt sich ein, ferner ein laut klingendes, immer rascher werdendes Anstossen der Herzspitze an die Brustwand, als ob der Thorax durchrannt und zerspringen müßte. Dabei wird über Zischen und Brausen in den Ohren geklagt, was sich nicht selten zu wüstem Tosen steigert, während die Gehörs Wahrnehmungen noch intact sind, und erst später eine Alteration erfahren.

Schon in diesem Stadium begegnet man eigenthümlichen Sprachstörungen, dem Ausfall von Worten, der Unmöglichkeit, einen begonnenen Satz zu vollenden. Bei fortgesetztem Einathmen von Chloroform schwindet die Klarheit der Sinne und des Denkens immer mehr und mehr, Hallucinationen, Delirien von bald ruhigem, bald stürmischem Character stellen sich ein. Das Gesicht ist zu dieser Zeit, wo das Bewußtsein noch theilweise erhalten ist, leicht geröthet, die Conjunctivae sind injicirt, die Augen thränen, die Pupillen erweitern sich, auf Lichtreiz träge reagirend, die bulbi stehen nach oben, der Puls wird frequenter und voller, und die Respiration ist gewöhnlich beschleunigt; auch das Empfindungsvermögen hat eine Abnahme erfahren, wie den Aeußerungen der Kranken, die darüber noch Auskunft zu geben vermögen, oder bei denen schon in diesem Stadium kleine Operationen vorgenommen wurden, zu entnehmen ist, wenn auch nicht selten die Reflexerregbarkeit erhöht ist.

Bei Fortsetzung der Chloroformirung scheiden sich die Chloroformnarcosen in drei Gruppen. Der Chloroformirte verfällt erstens entweder ohne Uebergangsstadium in complete Bewußtlosigkeit in Form eines ruhigen, traumlosen Schlafes. Ohne eine Spur von Muskelspannung oder psychischer Aufregung erlöschen Sensibilität und Reflexerregbarkeit und erst die Beseitigung des Chloroforms stört diese absolute Ruhe

des Körpers und der Psyche. Diese verhältnißmäßig sehr seltenen, idealen Narkosen sieht man hauptsächlich bei Kindern, was natürlich nicht ausschließt, daß auch bei ganz jugendlichen Individuen die Chloroformirung nicht in dieser gewünschten Weise verläuft.

Bei einer zweiten Gruppe bildet den Uebergang in den tiefen, ruhigen Chloroformschlaf ein rasch vorübergehendes Erzittern oder ein kurz anhaltender tonischer Krampf einzelner Muskelgruppen, der sich nach kurzer Zeit wieder löst und sich oft mit leisem Stöhnen und unregelmäßiger Respiration combinirt.

Oder endlich drittens der tiefe Chloroformschlaf wird durch große Muskelunruhe und wilde Träume, oft durch einen förmlichen Exaltationszustand eingeleitet, und dies ist auch das Gewöhnliche. Die Scene beginnt gewöhnlich mit krampfartigen Bewegungen der Extremitäten, mit Contraction der Gesichtsmuskeln, auch wohl mit Trismus oder mit cataleptischen Zuständen, so daß z. B. der aufgehobene Arm längere Zeit in der ihm gegebenen Stellung verharret.

Nach und nach betheiligen sich mehr und mehr Muskelgruppen an diesen Krämpfen, der Kranke fuchelt mit Armen und Beinen in der Luft herum, richtet sich von seinem Lager auf und krümmt oft wie im Opisthotonus seinen Rücken; das in Expirationsstellung verharrende Zwerchfell hindert die Athmung, die brettartig contrahirten Bauchmuskeln pressen zuweilen die gefüllte Blase oder den Inhalt des Rectum aus. Mitunter erreicht die Muskelagitation einen solchen Grad, daß der Kranke sich förmlich auf dem Operationstisch herumwälzt und wie ein Tobfächtiger mit Händen und Füßen um sich schlägt. Bei andern Kranken äußert sich die Muskelunruhe mehr durch einfache Abwehrbewegungen, durch das Greifen nach dem Kopfe, durch Versuche die Chloroformmaske zu beseitigen. Noch andere halten sich krampfhaft am Operationsbett, an ihren Kleidern, an der Hand des pulsführenden Arztes.

Hand in Hand mit dieser Muskelagitation gehen fast immer Aeusserungen der Psyche, laute Träume, die sehr oft nur in lautem Stöhnen und Wehklagen, Herauspressen unarticulirter Laute, Aufschreien und Lachen bestehen.

Zusammenhängende Aeusserungen haben sehr häufig Bezug auf die bestehende Krankheit oder die vorzunehmende Operation, auf die frühere Behandlung und die Umgebung. Mancher ist misstrauisch, schimpft auf Arzt und Wärter und bricht in immer steigender Aufregung zuletzt in ein förmliches Toben, Schreien und Brüllen aus, das sich bis in die tiefe Narkose fortsetzt, beim vorübergehenden Siftiren der Chloroformirung und in seltenen Fällen selbst beim Wiedererwachen aus der Narkose von Neuem beginnt.

Ein Anderer erzählt ängstlich und verzagt die Geschichte eines Bekannten, der während der Operation plötzlich starb; bricht in lautes Weinen und Schluchzen aus und verfällt mit den Worten: »Auch mit mir ist es aus,« in tiefen Schlaf.

Wieder ein Anderer macht witzige und malitiöse Bemerkungen über seine Umgebung, lacht und singt mitunter eine ganze Strophe eines Liedes oder gar mehrere Strophen correct und ohne sich durch die Operation oder Untersuchung unterbrechen zu lassen. Noch Andere leiern lange Gebete herunter oder versuchen sich in fremden Sprachen.

Nur ausnahmsweise hat man beobachtet, daß die Träume ganz ohne Zusammenhang sind mit der Krankheit, der Operation und der gegenwärtigen Situation, und der Chloroformirte sich mit Gegenständen, Liebhabereien, Gewohnheiten beschäftigt, die ganz ferne liegen. Aber auch bei dieser letzten Gruppe tritt, allerdings später als bei den zwei vorhergenannten, mit fortgesetzter Chloroformirung allmählich psychische und physische Ruhe ein.

Auch der redseligste und aufgeregteste Kranke stammelt schliesslich nur noch einige unarticulirte Laute vor sich hin und

verstummt endlich ganz, die krampfartig contrahirten Muskeln erschlaffen allmählich und bald ist es soweit, daß ein aufgehobenes Glied, wie beim Todten, widerstandslos wieder herabfällt, zuletzt erschlaffen die Masseteren, die oft noch, wenn schon sämmtliche Muskeln des Körpers schlaff geworden, die Kiefer fest aufeinander pressen. Das Gesicht verliert seinen Tonus und wird blässer, die unterdessen eng gewordenen Pupillen reagiren nicht mehr auf Lichtreiz und ebenfowenig auf mechanische, thermische oder elektrische Insulte der sensiblen Nerven der Conjunctiva und Cornea, die bulbi machen asymmetrische Bewegungen, der Puls ist deutlich verlangsam, die Respirationsbewegungen sind meist wieder regelmässiger geworden, aber sehr oberflächlich, oft kaum sichtbar, und die Körpertemperatur fängt langsam an zu sinken. Damit ist nun der Grad der Narkose erreicht, in welchem die grösste Operation begonnen und bei Festhaltung der Narkose schmerzlos zu Ende geführt werden kann. Das Erwachen aus dem Chloroformschlaf erfolgt gewöhnlich rasch unter plötzlicher Erweiterung der Pupillen. Viele Kranke fühlen sich nachher ganz wohl und können nicht begreifen, daß die Operation schon vorüber sein soll. Nicht selten stellt sich unmittelbar nach dem Erwachen Neigung zum Schlaf ein, und namentlich Kinder schlafen oft schon auf dem Operationstisch wieder ein und erwachen später aus diesem physiologischen Schlaf munter und frisch. Zarte Naturen, zumal Frauen, fangen an zu weinen, oder verfallen in förmliche Wein- und Schluchzkrämpfe.

Manche Chloroformirte erwachen mit Eingenommenheit des Kopfes und Kopfschmerz, klagen über Schwindel, Ueblichkeit und Brechreiz, brechen auch wohl, erholen sich aber rasch aus diesen unangenehmen Zufällen.

Nach lange dauernden Narkosen, bei geschwächten Individuen, oder auch ohne nachweisbare Ursache bleiben diese Symptome, verbunden mit unaufhörlichem Brechreiz, grosser Hinfälligkeit und Reizbarkeit Stunden und Tage lang.

Zuweilen benimmt sich der Chloroformirte nach Wiederkehr des Bewußtseins wie ein Betrunkener, stammelt unverständliche Worte, wankt, taumelt, fällt in die Kniee, als ob ihm das Coordinationsvermögen abhanden gekommen wäre, und ganz selten beobachtet man auch nach der Narkose einen hohen Grad psychischer Aufregung, sich äußernd durch Schreien, Singen, gewaltsame und stürmische Bewegungen.

Nachdem ich nun ein allgemeines Bild der Narkose entworfen habe, erlaube ich mir, die wichtigeren Symptome einer näheren Betrachtung zu unterziehen, und beginne mit dem Circulationsapparat.

Der Arterienpuls ist fast regelmäßig schon vor Beginn der Chloroformirung in Folge der Aufregung und Angst des Kranken beschleunigt und kleiner, als sonst. In der ersten Zeit der Chloroformwirkung nimmt bei gleichbleibender oder vermehrter Spannung des Arterienrohrs die Pulsfrequenz noch zu, gewöhnlich um 10—20 Schläge in der Minute.

Mit dem Erlöschen der Sensibilität, dem Auftreten der Pupillenverengerung und der Erschlaffung der Muskulatur, läßt auch die Frequenz des Pulses, der zu dieser Zeit ein *Pulsus tardus* und *mollis* ist, wieder nach, und zwar wird der Puls nicht nur langsamer, als bei und vor Beginn der Narkose, sondern auch langsamer, als unter normalen Verhältnissen, und zwar schwankt die Differenz von 4—30 Schlägen.

Den besten Aufschluß über die Beschaffenheit des Arterienpulses unter Chloroformwirkung gibt der Sphygmograph. Die mittelst des Marey'schen Sphygmographen aufgenommenen Pulscurven lassen ganz auffallende Veränderungen erkennen, die fogleich näher beschrieben werden sollen.

Der aufsteigende Schenkel der Pulswelle steigt meist etwas schräger empor, der Curvengipfel ist abgerundet, exquisit kolbig und der absteigende Schenkel hat stets eine bedeutend schrägere Richtung angenommen.

Die Rückstoßelevation liegt sehr hoch, dem Curvengipfel

nahe und ist nur wenig ausgeprägt, so daß die große Incisur ganz erheblich verflacht erscheint, mitunter findet sich auch die Spur nicht einer Rückstoßelevation. Von Elasticitätsschwankungen am absteigenden Schenkel beobachtet man selten auch nur eine Andeutung. Bei einer größeren Anzahl der Curven ist endlich deutliche Anacrotie erkennbar.

Der Puls der tiefen Chloroformnarkose ist demnach ein *pulsus tardus* oder *pulsus rotundo-tardus* oder endlich ein *pulsus monocroto-tardus* und sehr häufig ein *pulsus tardus* mit deutlicher Anacrotie.

Die Abstumpfung des Cürvengipfels und das mehr schräge Niederfinken des Schreibhebels wird sich wohl, wie bei der Curve, die Landois an der arteria femoralis des Hundes nach Durchschneidung des Rückenmarks erhielt, am ungezwungensten so erklären lassen, daß das Gefäß nach der systolischen Ausdehnung sich nur noch durch die Elasticität seiner Wandung und nicht mehr durch die Contraction der Gefäßmuskeln verengt, da die Vasomotoren gelähmt sind.

Aber auch das Auftreten des Anacrotismus und die Abschwächung der Rückstoßelevation können nur Folge verminderten arteriellen Blutdrucks und einer Verlangsamung des Blutlaufes sein und beweisen somit die durch Chloroformwirkung gefunkene Innervation des Kreislauffystems.

Die vermehrte Herzaction im Beginne der Narkose dokumentirt sich überdies durch einen verstärkten, oft hebenden Spitzenstoß, durch sichtbares Klopfen kleiner Arterien z. B. A. temporalis, A. thyreoidea etc.

Später, mit Abnahme der Pulsfrequenz, verschwindet auch der Spitzenstoß und das auf Distanz sichtbare Pulsiren der oberflächlich gelegenen Arterien. Das im Beginn der Chloroformirung geröthete Gesicht erblaßt allmählich, die früher tief rothen Lippen werden blaßroth und bei unregelmäßiger Respiration leicht bläulich, nur die Injection der Conjunctivalgefäße verliert sich langsam und sehr spät.

Häufig beobachtet man gegen Ende der Narkose am Halfe deutlichen Venenpuls, der allerdings durch das Experiment noch nicht aufgeklärt ist.

Was das Verhalten der Körpertemperatur in der Chloroformnarkose betrifft, so tritt ausnahmslos eine Erniedrigung derselben auf, die zwischen $0,2^{\circ}$ und $1,1^{\circ}$ C ungefähr schwankt. Das Maximum des Temperaturabfalls fällt aber meist in eine Zeit, wo die übrigen Erscheinungen der Narkose schon längst vorüber sind.

Im Uebrigen aber geht die Temperaturerniedrigung Hand in Hand mit den anderweitigen Chloroformerscheinungen, insofern einer tiefen Narkose gewöhnlich auch ein stärkerer Temperaturabfall entspricht, als einer leichten Narkose.

Wie alle sonstigen Wirkungen des Chloroforms wieder verschwinden, so auch der Temperaturabfall. Wie aber das Sinken der Temperatur von allen Symptomen die längste Zeit beansprucht, so verlangt auch die Ausgleichung dieser Störung eine verhältnißmäßig lange Zeit, die beiläufig zwischen 20 Minuten und 5 Stunden schwankt und nur selten weniger als eine Stunde beträgt.

Wohl die größten individuellen Verschiedenheiten und Unregelmäßigkeiten von allen Symptomen der Chloroform-Narkose bietet die Respiration, die sich fast in jedem Fall wieder anders gestaltet und nur, wenigstens für die Mehrzahl der Narkosen, darin eine Uebereinstimmung zeigt, dass nach längerer Einwirkung des Chloroforms eine Abnahme der Athemfrequenz und der Intensität der Athemzüge gewöhnlich beobachtet wird. Es kommt hier neben der erst später auftretenden Wirkung des Chloroforms auf das Centrum der Respirationsbewegungen hauptsächlich die locale Wirkung desselben auf die Nerven der Schleimhaut des Respirationstractus in Betracht, die auch jedem andern Gase, das eine irritirende Wirkung auf die Schleimhautnerven auszuüben vermag, zukommt und den größten individuellen Schwankungen unterworfen ist.

Sehr häufig bemerkt man im Beginn der Narkose eine Zunahme der Respirationsfrequenz, nicht selten wird schon nach einigen Minuten die Respiration unregelmässig, stofsweise, feufzend, faccadirt. Völliger Stillstand der Respiration tritt in allen Stadien, namentlich aber in der ersten Zeit der Narkose, mit allen Zeichen des aufgehobenen Lungengaswechsels auf.

Zuweilen sind die Athembewegungen eigenthümlich, oberflächlich, zitternd, kaum wahrnehmbar.

Die brettartige Spannung der Bauchmuskeln hemmt nicht selten die Excursionen des Zwerchfells.

Das Verschlucken der Zunge ruft mitunter alle Symptome der Larynxstenose hervor: die unteren Thoraxpartieen, die Claviculargruben werden bei jeder Inspiration mit Macht eingezogen. Lautes Schnarchen, fast regelmässig mit der complete Anästhesie zusammenfallend, ist häufig und bedingt durch Anästhesie der Luftwege und mangelhafte Expectoration des Schleims.

Sehr selten und zumeist bei jugendlichen Individuen geschieht es auch wohl, dass die Respiration keinerlei wesentliche Anomalien darbietet, und der Chloroformirte fast ebenso ruhig und regelmässig, bei tiefer Narkose etwas langsamer, athmet, als im physiologischen Schlaf.

Huften beobachtet man oft, namentlich zu Anfang der Narkose. Derselbe wird hervorgerufen einerseits durch die reizende Wirkung der Chloroformdämpfe auf die Schleimhaut des Respirationstractus, andererseits durch das Hinabfließen von Schleim und Speichel, welch letzterer reichlicher als sonst abgefordert wird, in den Rachen und Kehlkopf.

Der Zustand der Pupillen ist für die Beurtheilung des Grades der Narkose von ganz besonderer Bedeutung.

Kurze Zeit nach Beginn der Inhalationen werden die Pupillen langsam weiter und reagiren nur noch träge auf einfallendes Licht. Diese Erweiterung zeigt die verschiedensten Grade von kaum merklicher Zunahme des Durchmessers bis

zu einer ganz beträchtlichen Vergrößerung, doch eine Erweiterung ad maximum und vollständige Reactionslosigkeit gegen Licht tritt dabei nicht ein. Diese Pupillenerweiterung fällt somit in eine Zeit, wo das Bewusstsein allmählich schwindet, aber noch nicht aufgehoben ist, daher in eine Zeit, wo die Schmerzempfindung vermindert, und eine mehr weniger große Aufregung der Psyche und Muskelagitation vorhanden ist.

Später bei weiterem Chloroformiren verengt sich die Pupille. Sie nimmt vorerst die frühere Größe wieder an, wird aber regelmässig noch kleiner, halb so groß oder noch kleiner, als vor der Narkose. Auch in diesem verengten Zustande reagiert sie anfänglich noch träge auf einfallende Lichtstrahlen durch weitere Verengung, später wird sie gegen Licht unempfindlich, erweitert sich aber regelmässig noch auf Stechen und Kneipen der Haut, zuweilen auch noch auf starkes Anschreien. (Westphal.)

Noch später, wenn Nadelftiche in die Haut des Körpers und Gesichts und in die Mund- und Nasenschleimhaut keine Erweiterung der Pupillen mehr auslösen, erweitern sie sich, wenn auch träge, auf Berührung der Cornea. Beeinflusst auch diese die Größe der Pupillen nicht mehr, so ist nicht nur, wie übrigens schon mit dem Auftreten der Pupillenverengung, Anästhesie vorhanden, sondern man ist dann auch gesichert vor einer raschen Wiederkehr des Bewusstseins und des Schmerzgefühls.

Nicht selten wird beobachtet, dass bei Berührung der Cornea der M. Orbicularis nicht mehr zuckt, während die Pupillen sich noch ein klein wenig erweitern. Beim plötzlichen Erwachen aus der Narkose sieht man oft eine plötzliche maximale Erweiterung der bis dahin verengten Pupillen, die kurze Zeit in diesem Zustande verharren, dann auf Licht träge zu reagieren anfangen und ganz allmählich zu ihrer früheren Größe zurückkehren.

Ist das Erwachen aus der Narkose ein protrahirtes, so

erweitern sich die Pupillen langsam, aber niemals ad maximum. Eine plötzliche, maximale Erweiterung beobachtet man auch häufig beim Eintreten von Brechbewegungen und wirklichem Erbrechen. Ein weiteres Symptom von Seiten der Augen ist der Verlust der Association der Augenbewegungen, das Auftreten dissociirter Wanderungen der bulbi in der tiefen Narkose; diese Erscheinung geht gleichzeitig einher mit der Pupillengerade und dem Erlöschen der Reflexerregbarkeit der Cornea.

Im Beginn der Narkose rollen die bulbi gewöhnlich nach oben, so daß sich die Pupillen hinter den obern Lidern verstecken, und zeigen, wie im physiologischen Schlaf, leichte Divergenz, wenn nicht eine krampfartige Wendung der parallelen Augenachsen bald nach rechts oder links und oben vorhanden ist, zuweilen begegnet man auch nyctagmusartigen Oscillationen.

Im späteren Verlauf der Narkose, wenn die Pupillen sich verengen, und auf sensible Reize nicht mehr reagieren, die Reflexerregbarkeit der cornea erlischt, die Muskulatur schlaff und die Respiration schnarchend ist, stehen die Sehachsen gewöhnlich wieder in der Horizontalebene, und nun bemerkt man, worauf Mercier und Warner zuerst die Aufmerksamkeit lenkten, das interessante Phänomen, daß, während der eine bulbus gerade nach vorne sieht und ruhig stehen bleibt, der andere langsam nach innen oder außen wandert und auch wohl, die Horizontalebene verlassend, nach oben gleitet; zuweilen bewegen sich auch beide bulbi entweder nach verschiedener Richtung oder nach derselben Richtung, aber mit verschiedener Exursionsweite.

Mit dem Erwachen aus der Narkose stellt sich alsbald wieder die Association der Augenbewegungen ein.

Die dissociirten Wanderungen der bulbi sind ein sicheres Symptom der vollständigen und tiefen Narcofe.

Von Seiten der Digestions-Organen kommen außer dem Brechen keine besonderen Erscheinungen zur Wahrnehmung. Den Brechbewegungen und dem wirklichen Brechen

von Mageninhalt oder Schleim, zuweilen auch von Galle, begegnet man in allen Stadien der Chloroformnarkose; im Beginn derselben besonders bei Individuen, die kurz vor der Inhalation Nahrung zu sich nahmen.

Die Art und Weise des Zustandekommens von Brechen durch Chloroformwirkung ist bis jetzt noch nicht näher studirt worden. Die vermehrte Speichel- und Schleimabfonderung, die nie den hohen Grad, wie bei der Aetherification, erreicht und die, wie Claude und Bernard dargethan, lediglich auf einer localen Wirkung des Chloroforms auf die Mundschleimhaut beruht und wegfällt, sobald direkt durch die Trachea chloroformirt wird, ist selten der Art, daß sie den normalen Verlauf der Narkose in irgend einer Weise beeinträchtigt. Die gewöhnlich etwas vermehrte Secretion der Thränendrüsen hängt, wenn sie nicht psychischen Einflüssen zuzuschreiben ist, ebenfalls von einer localen Wirkung der Chloroformdämpfe auf die Nasenschleimhaut und auf die Conjunctiva ab.

Chaffaignac erzählt von einer Frau, die wegen eines großen Abscesses der linken Brustdrüse unter Chloroform operirt worden war und kurz nach dem Erwachen aus der Narkose ihrem mehrere Monate alten Kinde die rechte Brust gab. Das Kind wurde somnolent und blaß und erholte sich erst nach einigen Stunden. Dies ist wohl ein ziemlich sicherer Beweis, daß Chloroform in das Secret der Brustdrüse übergegangen war. Zweifel hat den Nachweis geliefert, daß das Chloroform auch in das Blut des Foetus übergeht.

Der Verlust der Sensibilität und des Schmerzgefühls geht seinen bestimmten Gang.

Am frühesten nimmt das Empfindungsvermögen am Rücken und an den Extremitäten ab, etwas später an den empfindlicheren Theilen des Genitalapparates und noch später erlischt die Sensibilität an den vom N. Trigeminus versorgten Theilen am Gesicht, zuletzt insbesondere an der Haut der Nase, der Schläfengegend, an der Bindehaut und endlich auch an

der Hornhaut des Auges. Das Wiedererscheinen der Sensibilität beim Erwachen aus der Chloroformnarkose geht den umgekehrten Weg, indem Cornea und Conjunctiva, sowie überhaupt die vom N. Trigeminus versorgten Parthieen zuerst wieder leitungsfähig werden.

Die Mehrzahl der in tiefer Narkose operirten Kranken gibt während der Operation keine Schmerzensäußerungen kund.

Eine Anzahl von Kranken dagegen gibt auch in der Narkose, und zwar ohne eigentliches Erwachen aus derselben, Schmerzenslaute, wie Stöhnen, Schreien, Jammern, oft in Verbindung mit Abwehrbewegungen, von sich, aber die Kranken geben nach dem Erwachen an, keine Schmerzen verspürt zu haben.

Man darf nun mit gutem Rechte annehmen, daß diese Schmerzensäußerungen zu den unbewußten Reflexbewegungen gehören.

Wir unterscheiden 3 Stadien der Chloroformnarkose: 1. Stadium der Willkür, 2. Stadium der Excitation und 3. Stadium der Toleranz.

Da man in dem Stadium der Toleranz auch die größten Operationen schmerzlos ausführen kann, so soll für den Chirurgen ein 4. Stadium, das sog. Stadium paralyticum (Stadium der erweiterten Pupillen) nicht existiren.

Die Kunst des Chloroformirens besteht ja gerade darin, den Kranken in dem Stadium der verengerten Pupillen, der Muskeler schlaffung und der completen Anästhesie mit erloschener Reflexerregbarkeit zu erhalten und ihn weder aus demselben in ein früheres, noch in das Stadium der erweiterten Pupillen, welches der Lähmung der Circulations- und Athmungscentren unmittelbar vorausgeht und somit die größte Gefahr involvirt, überzuführen.

Die Dauer der einzelnen Stadien, die zudem nie scharf von einander abgegrenzt werden können, zeigt soviel individuelle

Verschiedenheiten, daß allgemein gültige Regeln nicht aufgestellt werden können, überdies erleidet durch das Verhalten der Kranken in der Narkose die Art des Chloroformirens fast ebensoviel Variationen, als Kranke chloroformirt werden.

Die Symptome der Chloroformnarkose bestehen also im Wesentlichen in Alterationen der Sinneswahrnehmungen, in Störung der Intelligenz, fast regelmäsig in vorübergehend erhöhter Reflexerregbarkeit und krampfhaften Muskelkontractionen, in allmählichem Erlöschen der Sensibilität, des Bewußtseins und endlich auch der Reflexerregbarkeit, in Veränderungen der Pupille, in constanten Erscheinungen von Seiten der Circulation und Respiration, in Erschlaffung der willkürlichen Muskulatur und in Abnahme der Körperwärme.

Da die experimentellen Arbeiten über die physiologische Wirkung des Chloroforms im Allgemeinen noch ziemlich lückenhaft sind, so bleibt die prompte Deutung und Erklärung der genannten Chloroformsymptome noch künftigen Forschungen überlassen.

Im Großen und Ganzen stehen sich bezüglich der physiologischen Wirkung des Chloroforms auf den thierischen Organismus zwei Ansichten gegenüber. Nach der einen sind es lediglich Veränderungen im Blute d. h. chemische, durch das Chloroform selbst bewirkte Veränderungen der rothen Blutkörperchen in specie des Hämoglobins, welche die Erscheinungen der Chloroformnarkose hervorrufen und unterhalten; nach der anderen, der sich wohl die Mehrzahl der Physiologen und Aerzte angeschlossen hat, ist das Blut nur der Träger des Giftes, das, allerdings auf noch nicht näher erforschte Weise direkt auf die Centralnervengorgane einwirkt.

Aus den Arbeiten Bernsteins geht hervor, daß in einem gewissen Stadium der Narkose die sensiblen Ganglienzellen gelähmt sind, während die motorischen noch functioniren.

Die Lähmung der motorischen Zellen folgt erst nach, wie das Aufhören aller Reflexbewegungen in der tiefen Nar-

köfe und das schließliche Sistiren der automatischen Herz- und Respirationsbewegungen in der tödtlichen Narkose darthut.

In der Chloroformnarkose zeigt somit die Nervenfafer keinerlei Funktionsstörung, sie behält ihre normale Erregbarkeit. Angriffspunkt des Giftes ist die Ganglienzelle, und zwar die sensible zuerst, später erst die motorische.

Auf welche Weise diese vorübergehende Functionsstörung der Ganglienzellen zu Stande kommt, welche Veränderungen überhaupt während der Narkose in den nervösen Centralapparaten vor sich gehen, darüber weiß man noch nichts Sicheres.

Was das Verhalten des Blutdruckes anlangt in der Chloroformnarkose, so war schon von Lenz, Brunner und Gall unter Einwirkung des Chloroforms ein Sinken des Blutdrucks beobachtet worden.

In Hinsicht auf die Pupillenveränderungen kamen Raehlmann und Witkowsky zu dem Resultat, daß die Pupillenweite nicht allein vom Lichteinfall und der Accommodationsspannung abhängig sei; sondern auch von psychischen und sensiblen Einwirkungen der Außenwelt, die von Hirn und Rückenmark aus auf die medulla oblongata und von hier auf sympathischen Bahnen auf die Iris, die sie zu erweitern streben, übertragen werden.

Alle diese Erweiterungsreize der Pupille fallen im natürlichen und künstlichen Schlafe weg. Die Pupille ist also im Schlafe und während der tiefen Chloroformnarkose eng, weil ihr der Reiz zur Erweiterung fehlt.

Die anfängliche Erweiterung der Pupille ist wohl von 2 Faktoren abhängig, einmal von der psychischen Erregung, der Furcht vor der bevorstehenden Operation und sodann von der Erregung der im ductus nasolaryngealis verlaufenden Trigeminafasern, die reflectorisch die Iris erweiternden Sympathicusfasern erregen.

Die Uteruscontractionen bei der Geburt werden auch in der tiefen Chloroformnarkose nicht aufgehoben; über den Ein-

fluß der Chloroforminhalationen auf die Darmmuskulatur ist nichts Bestimmtes bekannt; doch stimmen die meisten Beobachter darin überein, daß die peristaltische Bewegung auf Chloroforminhalationen vermehrt wird.

Die Ausscheidung des Chloroforms aus dem Organismus geschieht hauptsächlich durch die Lungen, nach Lallemand, Perrin und Duroy zu geringem Theile auch durch die Haut.

Nothnagel fand durch Versuche an Kaninchen, daß in allen Fällen, wo die Thiere starben, (3 in der Aether-, 4 in der Chloroformnarkose) eine fettige Degeneration verschiedener Organe, hauptsächlich des Herzens und der Leber Platz griffen. Vergleichende, mikroskopische Untersuchungen vor und nach der Application von Chloroform bewiesen, daß die Veränderungen im Lebergewebe durch die Einführung des Anaestheticums (Aether und Chloroform) herbeigeführt worden waren.

Als einen der häufigsten und mitunter sehr gefährlichen, üblen Zufall während der Chloroformirung bezeichne ich vor Allem das Erbrechen. Diese unangenehme Complication tritt im Großen und Ganzen häufiger bei lange dauernden Operationen und Narkosen auf, als bei kurz dauernden Chloroformirungen und zwar fast regelmäsig bei gefülltem Magen; Erbrechen stellt sich bei manchen Individuen aus nicht näher bekannten Ursachen jedesmal ein, so oft sie chloroformirt werden.

Man beobachtet daselbe in allen Stadien der Narkose, häufiger jedoch bei noch nicht ganz erloschenem Bewußtsein oder am Ende der Narkose, seltener zu der Zeit, wo der Kranke unter dem vollen Einflusse des Chloroforms steht. Diesem Umstande und der Thatfache, daß mit dem Erbrechen der Kranke gewöhnlich aus der Narkose erwacht, ist es wohl zuzuschreiben, daß ein eigentlicher Erstickungstod der Chloroformirten durch Eindringen von Mageninhalt in die Luftwege sehr selten beobachtet wird.

Ein weiterer, unangenehmer Zufall während und nach

der Chloroformnarkose ist das Auftreten großer, psychischer Aufregung, meist verbunden mit großer Muskelagitation, mit heftigen clonischen und tonischen Krämpfen.

Die höchsten Grade derselben findet man bei hysterischen Frauenzimmern und bei Individuen, die unter der chronischen Einwirkung des Alkohols leiden. Bei letzteren, die schon in der ersten Periode die Chloroformirung durch lautes Lärmen und Toben nicht selten erschweren, geschieht auch das Erwachen oftmals langsam, und den Uebergang aus der Narkose zum vollen Bewusstsein bildet ein Zustand, den man am besten mit dem ersten Stadium der acuten Alkoholintoxication vergleichen kann. Der Kranke ist gehobener Stimmung, singt lustige Lieder oder stammelt unverständliche Worte, macht allerlei unzweckmäßige Bewegungen, wankt, auf die Beine gestellt, wie ein Betrunkener und erholt sich erst oft sehr spät aus diesem Rauschzustande. Noch unangenehmer äußert sich mitunter die Aufregung hysterischer Frauenzimmer, die manchmal namentlich beim Erwachen aus der Narkose in einen wahren Tobfuchtsanfall ausbricht.

Höchst beunruhigend ist hie und da auch ein protrahirtes Erwachen aus der Narkose, so daß die Kranken durch Anrufen, Schütteln, selbst durch Bespritzen mit kaltem Wasser, durch Riechmittel etc. erst nach länger fortgesetzten Bemühungen geweckt werden können.

Erweiterung der Pupillen mit sehr langsamem Zurückgehen auf die Norm wurde fast in allen diesen Fällen beobachtet.

Von weit größerer Bedeutung sind diejenigen Zufälle während der Narkose, die sich auf Anomalien der Respiration beziehen:

Unregelmäßige Respirationsbewegungen zu jeder Zeit der Narkose gehören in das Gebiet der Regelmäßigkeit, wie schon erwähnt wurde.

Nicht selten aber kommt es schon im Beginne der Chloroformirung zu einem durch Reflex von den Trigeminus-Aesten

bedingten complete Respirationsstillstand in Expirationsstellung des Zwerchfells, wahrscheinlich verbunden mit krampfhaftem Verschluss der Stimmritze.

Diese Apnoë, die fast immer von leichter Cyanose des Gesichts begleitet ist, kann von selbst wieder verschwinden oder durch passende Eingriffe beseitigt werden. Gefährlicher ist der zur Zeit des Excitationsstadiums auftretende Respirationsstillstand, der unter folgenden Erscheinungen auftritt: das Abdomen ist gespannt, bretartig hart sich anführend, unbeweglich und auch am Thorax ist keine Spur von Bewegung sichtbar, fast immer ist starker Trismus vorhanden, so dass die Kiefer fest aufeinander gepresst sind, die Zunge ist durch tonischen Krampf ihrer Hebemuskeln gegen den weichen Gaumen und die hintere Pharynxwand angedrängt, die Epiglottis dadurch nach unten und gegen die Giessbeckenknorpel angedrückt.

Der auf diese Weise zu Stande gekommene Abschluss der oberen Kehlkopfapertur ist natürlich von allen Symptomen gestörter Lungen-Ventilation begleitet. Das ganze Gesicht röthet sich, wird dunkelblauroth, die Lippen werden tiefblau, die Venen des Gesichts und Halses schwellen an, die Bulbi werden vorgetrieben.

Alles die Folge mechanischen Respirationshindernisses. Dass auf diese Weise der Tod des Chloroformirten erfolgen kann und auch wohl schon erfolgt ist, steht ausser allem Zweifel, obwohl gerade dieser unangenehme Zufall leicht zu heben ist und den geübten Chirurgen nicht in Angst und Verlegenheit bringt.

Auch in den späteren Stadien der Narkose, wenn der Chloroformirte unter der vollen Wirkung des Anaestheticums steht, und die Muskeln erschlafft sind, kann eine neue Gefahr durch Vermittlung der Zunge erwachsen, indem sie bei dem horizontal gelagerten oder nach rückwärts geneigten Kranken, dem Gesetz der Schwere folgend, nach hinten sinkt, den

Kehldeckel auf die Giefskannen drückt und den Kehlkopf nach oben absperrt.

Auch hier werden wieder die gestörten Respirationsbewegungen und der Respirationsstillstand, sowie die Färbung des Gesichts und besonders der Lippen auf dieses leicht zu beseitigende Respirationshinderniß aufmerksam machen. Von einem eigenthümlichen Zustandekommen der Asphyxie erzählt Linhart.

Er beobachtete nämlich bei einer chloroformirten Kranken, daß bei vorhandenem Trismus die Seitenwand der Nase durch den äußeren Luftdruck beiderseits fest an das Septum gedrückt, und so die Nasenhöhlen verschlossen waren. Das Lüften der Nasenflügel beseitigte sofort die asphyctischen Erscheinungen.

Die größten Gefahren erwachen dem Chloroformirten aus Störungen im Bereich der Circulationsorgane. Zuweilen schon im Beginne der Narkose, häufiger erst nach längerer Einwirkung des Chloroforms, wird der Radialpuls, der bis dahin regelmäßig und kräftig war, aussetzend, die Respiration geht ihren normalen Gang oder wird auch unregelmäßig, und das Gesicht nimmt eine fahle Blässe an. Dieser Zustand bildet wahrscheinlich den Uebergang zur tödtlichen Syncope.

In allen Stadien der Chloroformnarkose nämlich, besonders wenn der Kranke unter dem vollen Einfluß des Chloroforms steht, manchmal auch, wenn der Chloroformirte schon einige Zeit kein Chloroform mehr eingeathmet hatte, treten zuweilen plötzlich und unerwartet Erscheinungen auf, die, sofern sie nicht den Tod zur Folge haben, doch den Chloroformirten jedesmal an den Rand des Grabes bringen.

Diese Erscheinungen sind unter dem Namen der Chloroformsynkope beschrieben und können durch keine Vorichtsmafsregeln ganz verhütet werden:

Ohne Vorboten, gewöhnlich auch ohne Störungen der Respiration nimmt das Gesicht des Chloroformirten plötzlich

eine cadaveröse, wachsbleiche Farbe an, die Gesichtszüge verfallen, die Hornhaut verliert ihren Glanz und die bis zum Maximum erweiterten Pupillen sind völlig reactionslos, der Unterkiefer sinkt herab. Zu gleicher Zeit verschwindet der Radialpuls, und die Herztöne sind nicht mehr hörbar oder außerordentlich schwach. Eröffnete, arterielle Gefäße bluten nicht mehr oder entleeren nur wenige Tropfen meist schwarzen Blutes.

Mit dem Herzstillstand sind auch die Respirationsbewegungen ohne Cyanose und Dyspnoë verschwunden, oder einige schnappende und keufzende Inspirationen überdauern das Cessiren des Herzschlags.

Die Muskeln sind schlaff und die aufgehobenen Glieder fallen widerstandslos auf das Operationsbett zurück. Zuweilen ist unwillkürliche Stuhl- und Urinentleerung wahrzunehmen.

Nach Sanfom findet der Chloroformtod beim Menschen auf dreierlei Weise statt: 1) durch Syncope, 2) durch Asphyxie, 3) durch Necrämie.

Der Tod durch Syncope ist entweder Folge des Verlusts der Irritabilität des Herzmuskels, d. h. das Herz wird bei der Obduction schlaff gefunden, und das Blut ist durch alle Höhlen vertheilt. Diese Form des Chloroformtodes hat große Aehnlichkeit mit dem Tod durch Shock und wird namentlich herbeigeführt durch heftige Aufregung, plötzliche Furcht oder durch zu rasche Einathmung großer Dosen Chloroform.

Befonders gefährdet durch diese Art Syncope sind Kranke mit Fettherz; oder der Tod durch Syncope ist bedingt durch tonischen Krampf des Herzens; das Herz wird bei dieser Form der Syncope stark contrahirt und leer gefunden.

Der Tod durch Asphyxie ist ein peripherischer oder ein centraler; peripherisch bei schon bestehender Lungen-Erkrankung, besonders Lungencongestion, central durch Lähmung der medulla oblongata.

Der Tod durch Necrämie endlich erfolgt durch eine falsche

Mischung des circulirenden Blutes, die das Herz schwächt, die Irritabilität des Nervensystems herabsetzt und den Stoffwechsel in den Capillaren aufhebt.

Ein Theil der bekannten Chloroformtodesfälle gehört unzweifelhaft in die Kategorie der noch nicht hinreichend aufgeklärten, schon vor Anwendung des Chloroforms bekannten, plötzlichen Todesfälle, wo der Tod kurz vor oder bei Beginn einer größern oder kleinern Operation erfolgt. Sie stehen außerhalb der Chloroformwirkung.

Cazenave z. B. berichtet von einem 40jährigen Mann, der amputirt werden sollte. Derselbe war so sehr herabgestimmt, daß man ihn nicht zu chloroformiren wagte und dahin übereinkam, dies nur scheinbar zu thun. Es wurde ein Tuch ohne Chloroform weit vom Gesicht vorgehalten. Patient hatte jedoch kaum 4 Athemzüge gethan, als plötzlich die Respiration stockte, und das Herz aufhörte zu schlagen. Der Unglückliche war todt.

Default zog bei einem Patienten, an welchem er die Lithotomie ausführen wollte, die Schnittlinie mit dem Fingernagel auf's perinaeum. Der Patient schrie plötzlich auf und war eine Leiche. Und derartige räthselhafte plötzliche Todesfälle ließen sich noch mehrere anführen. Das Auftreten der Chloroformsynkope und Asphyxie wird ganz besonders befördert durch zwei krankhafte Zustände des Organismus, nämlich durch den Alkoholismus und die fettige Entartung des Herzmuskels.

Es ist durch die Erfahrung constatirt, daß die Chloroform-Narkose bei Potatoren ziemlich regelmäsig auftretende Anomalien zeigt, die sich dadurch äußern, daß die Kranken vor Eintritt der Muskeler schlaffung ein ungewöhnlich lange dauerndes Stadium von großer Aufregung und heftiger Muskelaction mit oft sehr bedrohlichen Respirationsstörungen durchmachen und, endlich in das Stadium der Ruhe und Muskeler schlaffung über-

geführt, grofse Neigung zum Collaps und zu comatösen Zuständen haben.

Auch die Thatfache, dafs Kidd 9 Fälle ausfindig machte, wo während der therapeutischen Anwendung des Chloroforms bei Delirium tremens der Tod eintrat, spricht dafür, dafs Alkoholiker das Chloroform schlecht vertragen.

Als die gefährlichste Complication der Chloroformnarkose wird allgemein die fettige Degeneration des Herzmuskels angesehen, und es ist wohl a priori mit vollem Rechte anzunehmen, dafs ein fettig degenerirter Herzmuskel der Chloroformeinwirkung natürlich eher erliegt, als ein gesundes Herz, allein ein hinreichendes, klinisches Material ist noch nicht vorhanden, um diesen Satz genauer erläutern zu können.

Wenn nun in der Chloroform-Narkose gefahrdrohende Erscheinungen, wie Stertoröse oder stockende und schnappende Respiration, Lividität oder Blässe des Gesichts, plötzliche Erweiterung der Pupillen ohne Brechen und ohne Erwachen, Schwäche oder Unregelmässigkeit des Pulses, plötzlicher Collaps auftreten, so mufs das Chloroform sofort entfernt, und der Howard'sche Handgriff oder die Lüftung des Unterkiefers, oder das Vorziehen der Zunge, die Ausräumung des Rachens und das Aufstellen der Epiglottis mit dem Finger oder endlich das Vorziehen des Zungenbeins vorgenommen werden.

Kann damit die Gefahr nicht beseitigt werden, so ist der Chloroformirte in halb invertirte Stellung zu bringen, und es mufs, bei durch obige Manipulationen weit offenem Larynx, die künstliche Respiration eingeleitet werden.

Von den Methoden der künstlichen Respiration empfiehlt sich am besten diejenige Silvester's, oder dann die Insufflation mit Hülfe eines Larynxcatheters, abwechselnd mit Compression der unteren Thoraxparthieen.

Ist ein Inductionsapparat rasch bei der Hand, so kann die künstliche Respiration durch rhythmische Faradisation der N. phrenici fortgesetzt werden.

Die künstliche Respiration soll in verzweifelten Fällen bis auf eine halbe Stunde ausgedehnt werden, da man selbst nach 20 Minuten dauernder, vergeblicher Anwendung derselben das Leben wiederkehren sah.

Hat man Grund anzunehmen, daß während der künstlichen Respiration der freie Ein- und Austritt der Luft durch den Larynx auf irgend eine Weise trotz der eben erwähnten Manipulationen gehindert sei, so verbindet man die künstliche Respiration mit der Tracheotomie.

Während der künstlichen Respiration, aber ohne dieselbe einen Augenblick zu unterbrechen, kann ein Strahl kalten Wassers in's Gesicht, in die Nase oder auf die Zwerchfellgegend unter starkem Druck gespritzt, von Nutzen sein.

Daneben mag auch die methodische Friction der Extremitäten versucht werden. Stellen sich wieder Respirationsbewegungen ein, so wird zweckmäßig das erreichte Resultat durch Riechmittel, worunter Amylnitrit das beste ist, reizende Clystiere (Eßig, Brandy mit Wasser) und, wenn der Kranke wieder schlucken kann, durch innerlich gegebene Stimulantien zu erhalten und zu sichern gesucht.

Bezüglich der Anwendungsweise des Chloroforms kann man zwei Hauptmethoden unterscheiden. Bei der einen wird entweder nur mit einem mehrfach zusammengelegten oder in Form eines Conus gefalteten Tuche oder wegen der leichteren Handlichkeit mit dem Skinner-Esmarch'schen Chloroformkorb chloroformirt; diese Art zu chloroformiren ist besonders bei uns in Deutschland sehr verbreitet.

Bei der andern Methode hingegen werden complicirtere Apparate in Anwendung gebracht.

Der Unterschied besteht darin, daß bei der ersten Methode der Chloroformirende die Verdünnung der Chloroformdämpfe mit atmosphärischer Luft selbst besorgt, während bei der zweiten Methode diese Verdünnung vom Apparat effectuirt wird.

Während in England die complicirteren Apparate, namentlich in den Händen der fogen. Chloroformirer (die größeren Spitäler Englands haben ständige Angestellte zur Beforgung der Narkose) vielfache Anwendung fanden und noch finden, haben sie in Deutschland und Frankreich nie festen Boden gefasst.

Von den verschiedenen gemischten Narkosen hat sich nur die Morpiumchloroformnarkose als zweckentsprechend bewährt.

Pitha war der erste, der das Chloroform mit einem narkotischen Mittel und zwar mit Belladonna verband, als er anlässlich einer Herniotomie zuerst mit Aether und Chloroform, dann mit Chloroform allein nach 2stündigen, fruchtlosen Inhalationsversuchen eine ausreichende Narkose nicht erzielte. Durch Injection von 20 Gran Belladonnaextract in's Rectum wurde nicht allein eine tiefe Narkose erzielt, sondern auch eine Verlängerung derselben bis auf 12 Stunden. Der Kranke erwachte mit freiem Kopfe, aber geblendet, doch kehrte am nämlichen Abend das Sehvermögen wieder.

Zwei Jahre später machte Geh. von Nufsbaum die Entdeckung, dass die Chloroformnarkose 2—12 Stunden festgehalten werden könne, wenn man während der Excitationsperiode oder im Toleranzstadium 0,03—0,06 essigsaures Morpium subcutan injicire.

Derart behandelte Kranke blieben nun in einem tiefen Schlaf, aus dem sie mehrere Stunden lang durch kein Mittel zu erwecken waren, und erwachten schliesslich ohne Uebelkeit und Erbrechen. Die Beobachtung v. Nufsbaums wurde bald darauf auch von französischen Aerzten (Rabot) experimentell geprüft und in allen Punkten bestätigt.

Nach Claude Bernard stumpft die Morpium-injection die Nerven in einer Weise ab, dass dieselben schon durch Blut anästhesirt werden, das eine für die Aufhebung der Sensibilität normaler Nerven ungenügende Quantität Chloro-

form enthält. Chloroform und Morphinum wirken im nämlichen Sinne und ergänzen sich in Bezug auf anästhesirende und schlafbringende Wirkungen. Das Morphinum setzt die Irritabilität der Respirations Schleimhaut herab und verhindert so die Reflexe auf die Respirationsorgane und auf das Herz. Sodann erhöht das Morphinum in kleinen Dosen den Blutdruck in Folge von Reizung der excitomotorischen Herzganglien und Verengerung der peripheren Gefäße.

Die Vortheile der Morphinumchloroformnarkose, bestehend in der Abtumpfung der psychischen Aufregung, in der Abkürzung oder Beseitigung des Excitationsstadiums und in dem Verbrauch einer verhältnißmäßig geringen Menge Chloroform, sind von den verschiedensten Seiten klinisch constatirt und nur selten angefochten worden.

Labbé und Goujon kommen nach ihren klinischen Erfahrungen zu dem Schluß, daß man mit Hilfe einer vorausgegangenen Morphinum injection die Anästhesie schneller herbeiführen könne, und daß sie, einmal herbeigeführt, von längerer Dauer sei, daß auch wegen des geringeren Verbrauchs von Chloroform die Gefahr der Narkose verringert werde.

Aus den Mittheilungen Grosjean's, die auf Beobachtungen beruhen, welche in den Kliniken von Rigaud und Sarazin in Straßburg gemacht wurden, hebe ich hervor, daß die Morphinum injection mindestens 40 Minuten vor der Operation gemacht werden sollte, weil die rasche Aufeinanderfolge von Injection und Chloroformirung die Aufregung vermehren und das Auftreten asphyctischer Erscheinungen befördern soll.

Die Morphinumchloroformnarkose wird auch in der Klinik von Thierfch schon längere Zeit mit gutem Erfolge angewendet, und in neuerer Zeit von Koenig und Hüter warm empfohlen. Koenig injicirt meist nur 0,01 Morph. und geht selten über 0,02 Morph. hinaus. Er schickt die Morphinum injection der Narkose voraus; läßt aber auch während der Narkose, falls sich die Indication hiezu bietet, Morphinum

injciren. Regelmäßig wendet Koenig die Morphinumjectionen bei notorischen Säufern an, und überhaupt bei Individuen, bei welchen er eine größere Aufregung vermuthet oder während der Narcoſe bemerkt.

Wird kurz vor der Chloroforminhalation eine kleine Morphinumjection gemacht, und dann 12—20 Athemzüge Chloroform gegeben, ſo tritt bei vielen Menſchen ein Zuſtand ſogenannter Analgeſie ein, der namentlich für Gefichtsoperationen höchſt brauchbar iſt.

Die Kranken athmen ruhig fort, behalten regelmäßigen Herzſchlag, ſie wiſſen und fühlen, daſs geſtochen, geſchnitten wird, ſie huſten und ſpucken auf Commando aus, beantworten alle Fragen, haben aber keinen Schmerz dabei.

Namentlich in Frankreich wird dieſe Analgeſie oft erzeugt, und mit ähnlichem Erfolge; aber auch in Deutſchland findet dieſe Analgeſie Anwendung. Thierſch und Geh. v. Nufsbaum machten ſchon oft davon Gebrauch.

Zu ſubcutanen Injectionen hat ſich das Chloroform als unbrauchbar erwieſen, weil es das Gewebe zu ſtark reizt, und deſhalb eine locale Entzündung verurfachen würde.

Die Folge dieſes Entzündungsproceſſes wäre wahrſcheinlich auch eine mangelhafte Reforption des Mittels.

II.

Allgemeine Anaesthesie durch Aether.

Der Aether, Schwefeläther, Naphtha, Aethyläther ($C_2 H_5)_2 O$.

Der Aether iſt bekanntlich ungemein flüchtig, verdunſtet unter großer Temperaturerniedrigung und ſiedet ſchon bei $35^{\circ} C$. Er iſt ungemein entzündlich, brennt mit heller, ſtark ruſsender Flamme, und ſein Dampf explodirt, mit Luft gemengt, ſehr heftig.

Die phyſiologiſche Wirkung des Aethers zeigt in vielen Beziehungen die größte Aehnlichkeit mit der des Chloroforms.

Wie das Chloroform kann auch der Aether, in Gasform den Athmungsorganen zugeführt, in's Blut übergehen, und, wie beim Chloroform, beruht auch die betäubende Wirkung des Aethers höchst wahrscheinlich auf einer noch nicht näher gekannten Funktionsstörung der Nervencentra.

Eine Umwandlung des Aethers in den Geweben ist bis jetzt nicht nachgewiesen, dagegen dargethan worden, daß der größte Theil des inhalirten Aethers durch die Lungen, ganz geringe Mengen desselben auch durch den Urin und die Haut unverändert den Körper wieder verläßt. Der Aethertod kommt nach Vierordt's Thierversuchen immer durch Lähmung des Respirationscentrums zu Stande, und die Herzbewegungen überdauern den Respirationsstillstand. Untersuchungen mit dem Hämadynamometer ergaben, daß ein Fallen des Blutdruckes während der Aethernarkose erst dann bemerkbar wurde, wenn schon erhebliche Respirationsstörungen vorhanden waren, während in der Chloroformnarkose die Quecksilberfäule schon zu einer Zeit fiel, wo die Respiration noch keine Alterationen erkennen liefs. Schiff kam nach 5000 diesbezüglichen Experimenten zu ähnlichen Resultaten. Er sah die respiratorische Paralyse in der Aethernarkose zu Stande kommen, wenn Circulation und Blutdruck sich noch in den mit dem Leben vereinbaren Grenzen hielten. Oft nahm der Blutdruck zu, oft ab, aber immer war er hoch genug, um den Austausch der Kohlensäure gegen den Sauerstoff der Atmosphäre zu erlauben.

Bei der Aetheranwendung folgte die Gefäßlähmung der respiratorischen Paralyse nach, während beim Chloroform gewöhnlich das Umgekehrte stattfand.

Der Aether bildet zugleich ein Stimulans für das Herz, natürlich in entsprechender Dosis angewendet. Die subcutane Injektion des Aethers wurde besonders durch v. Hecker empfohlen und bei Ohnmachten und ähnlichen Collapszuständen erfolgreich angewendet.

Die sphygmographischen Untersuchungen zeigen, daß eine

Alteration der Pulscurve in der für schmerzlose Ausführung von Operationen hinreichenden Aethernarkose nicht in jedem Fall erfolgen muß, während in der tiefen Chloroformnarkose die Pulscurve ohne Ausnahme charakteristische und hochgradige Veränderungen macht. Knoll fand auch hinsichtlich der Wirkung auf die Athembewegungen einen Unterschied zwischen Aether und Chloroform. Ließ er Kaninchen mit durchschnittenen Halsvagus durch eine Trachealfistel Chloroform und Aether einathmen, so war die Wirkung der Aetherinhalation niemals so intensiv, wie die der Chloroforminhalation, und während das Chloroform ein sehr rasches Erlöschen der Respiration herbeiführte, reichte eine selbst viele Minuten andauernde Aetherinhalation unter gleichen Umständen nicht hin, um ein vollständiges Erlöschen der Respiration zu bewirken.

Die Erscheinungen während der Aetherisirung, die im Allgemeinen mit den Symptomen der Chloroformnarkose viel Uebereinstimmendes haben, unterscheiden sich von diesen doch auch wieder in einigen wesentlichen Punkten.

Anstie, der die Wirkung des Aethers an sich selbst studirte, nahm zunächst eine allgemeine Auftheiterung seiner Gemüthsstimmung mit Neigung zum Lachen, ein über den ganzen Körper sich ausbreitendes, angenehmes Wärmegefühl und Herzpalpitationen mit vermehrter Pulsfrequenz wahr, hierauf ein Gefühl von Taubheit und Prickeln, das, von den Füßen ausgehend, schnell den ganzen Körper durchzog, sowie das Ausbrechen von Schweiß an der Stirne. Die Gegenstände seiner Umgebung begannen sich vor seinen Augen zu drehen, er war unfähig, die Bewegungen seiner Hände wahrzunehmen, und hatte das Gefühl enormer Schwere in all' seinen Gliedern. Hierauf verlor er das Bewußtsein. Im Momente des Erwachens aus der Narkose war er unfähig, sich zu bewegen, hatte noch Ameisenkriechen in den Gliedern, war aber in weiteren 5 Minuten vollständig zum normalen Bewußtsein zurückgekehrt.

Wenn man wieder andere Kranke, während der Aethernarkose bei noch erhaltenem Bewußtsein, nach ihren subjektiven Gefühlen fragt, so klagen sie gewöhnlich schon nach den ersten Inhalationen über leichten Schwindel, Rauschen, Läuten und Singen in den Ohren, über Schwerhörigkeit, starkes Klopfen und Schlagen im Kopfe, später über schwere Füße, und über ein prickelndes Gefühl im ganzen Körper, noch später stellen sich Sprachstörungen ein, die Antworten werden durch Wortausfall sinnlos und unverständlich, und gehen schließlich in ein förmliches Stammeln über.

Die Stimmung im Beginne der Narkose ist fast immer heiter, und lautes Lachen, das sich zuweilen zu förmlichen Lachkrämpfen steigert, ist eine sehr häufige Erscheinung. Das sogenannte Stadium der Aufregung, d. h. die Periode der Narkose, die zwischen dem schwindenden und dem ganz erloschenen Bewußtsein mit Anaesthetie und mehr weniger vollständiger Muskeler schlaffung liegt, ist bei der Aethernarkose markirter und zieht sich mehr in die Länge, als bei der Chloroformirung. Rigidität fast der gesammten Körpermuskulatur, die heftigen Abwehrbewegungen, das Aufschnellen vom Operationslager, das Umsichschlagen mit Händen und Füßen, lautes Singen, Schreien und Schimpfen, Alles dies wird in der Aethernarkose sehr häufig beobachtet, während es in der Chloroform-Narkose doch verhältnißmäßig selten ist.

Auch im 3. Stadium, wo die Sensibilität erloschen und complete Bewußtlosigkeit eingetreten ist, ist eine absolute Muskeler schlaffung zwar nicht selten, aber bei Weitem nicht so constant, wie in der Chloroformnarkose, und schon bei kurzem Aussetzen des Anästhetikums sieht man schnell die Muskelaufregung von Neuem sich einstellen. Die Wirkung des Aethers ist entschieden langsamer und weniger nachhaltig, als die des Chloroforms, und es ist auch bei vollständig erloschenem Bewußtsein die Reflexaction der cerebrospinalen Centren in der Aethernarkose nicht in dem Grade erloschen, wie in der

Chloroformnarkose. Die anfängliche Röthung des Gesichts hält oft die ganze Zeit der Narkose an, das Auftreten von Schweiß ist fast regelmäfsig, der anfänglichen Zunahme der Pulsfrequenz folgt später eine Abnahme, die nach Dr. Kappeler's Beobachtungen zwischen 4—20 Schlägen schwankt. Wie beim Chloroformiren, so fällt auch beim Aetherisiren ausnahmslos die Körpertemperatur. Das Minimum des Abfalls beträgt $0,3^{\circ}$, das Maximum $1,5^{\circ}$ und das Mittel $0,68^{\circ}$ C. Die Symptome von Seiten der Respirationsorgane bieten womöglich noch mehr Regellosigkeit, als in der Chloroform-Narkose. Meist stockt die Athmung schon nach den ersten Inhalationen und der Kranke, der zu ersticken glaubt, sucht den Aetherinhalationsapparat zu entfernen. Ist dann durch energisches Zureden und vorübergehenden Zutritt atmosphärischer Luft die Respiration wieder in Gang gebracht, so treten nicht selten neue und unangenehme Erscheinungen auf, wie Räuspern und Husten. Erst in der tiefen Narkose werden die Athemzüge regelmäfsig, schnarchend und etwas verlangsam.

Der Aethernarkose eigenthümlich ist die immer auftretende, starke Salivation, die häufige Schluckbewegungen verursacht und durch Herabfliefsen des Speichels in den Rachen und Kehlkopf reflectorische Hustenstöße auslöst. Das Verhalten der Pupillen gibt, wie schon gesagt, in der Chloroformnarkose sehr werthvolle Aufschlüsse über den Grad der Anästhesie und ist insoferne von grofser Bedeutung.

Nicht das Gleiche kann von dem Verhalten der Pupillen in der Aethernarkose gesagt werden. Die anfängliche Pupillenerweiterung tritt zwar fast ausnahmslos ein, aber die spätere Verengung derselben im Stadium der Toleranz wird sehr oft vermisst. Dies kommt wohl hauptsächlich daher, dafs die Wirkung des Aethers weniger nachhaltig ist, als die des Chloroforms, und der Aetherisirte häufiger in die früheren Stadien der Narkose zurückfällt.

Gewöhnlich ist, wie beim Chloroform, das Erwachen von

einer plötzlichen, oft maximalen oder von einer allmählichen, mehr minder starken Erweiterung der Pupillen begleitet. Auch die atypischen Augenbewegungen konnten namentlich bei tiefen und langedauernden Aethernarkosen in ausgesprochener Weise wahrgenommen werden.

Das Erwachen aus der Aethernarkose ist mit mehr Nachleiden verbunden als das Erwachen aus der Chloroformnarkose. Schon der Aethergeruch, der die Kranken oft Stunden, selbst Tage lang, nicht verläßt, ist außerst quälend. Sehr häufig ist der Aetherisirte nach dem Erwachen längere Zeit in einem Raufchzustande, schwer beseinnlich, in gerührt weinerlicher oder aufgeregt heiterer Stimmung. Lach- und Weinkrämpfe, selbst förmliche hysterische Paroxysmen sieht man bei Frauen häufig. Rasches Erwachen und vollständiges Wohlbefinden nach der Narkose ist verhältnissmäsig selten, meist klagen die Kranken wenigstens über Stirnkopfschmerz, Unbehagen, Ueblichkeit. Mittelft des Aetherinhalationsapparates können rasche und gute Narkosen erzielt werden, so zwar, daß die Kranken schon nach 2---6 Minuten operationsbereit waren, und die Unempfindlichkeit der cornea und Erschlaffung der Muskulatur, ganz wie beim Chloroform, ohne oder mit wenig Muskelaufregung zu Stande kam.

Daß übrigens auch die Anwendung des Aethers nur relativ ungefährlich ist, beweisen die Todesfälle aus der Periode vor Einführung des Chloroforms sowohl, als auch der Umstand, daß seit der Wiedereinführung des Aethers in Lyon und England Aethertodesfälle in ziemlicher Zahl und bei vorsichtiger Anwendung dieses Anästheticums vorgekommen sind, und daß mit der häufigeren Anwendung des Mittels auch die Zahl der Unglücksfälle stieg.

Wegen seiner großen Flüchtigkeit kann man den Aether nicht, wie das Chloroform, ganz einfach auf ein Tuch gießen und mit diesem die Aetherdämpfe den Respirationsorganen zuführen, man bedarf zur Anwendung des Aethers in der

Chirurgie eines Inhalationsapparates; der einfachste Aetherinhalationsapparat ist derjenige von Warrington Haward, gewöhnlich die Haward'sche Lederfilzmaske genannt.

Auch durch den Mastdarm kann die Aethernarkose bewirkt werden.

Am 5. Juni l. J. sah ich in der chirurgischen Klinik des Geh. von Nufsbaum zum erstenmal eine neue Methode der Narkose, nemlich eine sogenannte Rectale Aether-Narkose.

Ein Glasfläschchen, das 200 ccm faßt, wurde mit 50 Gramm Schwefeläther gefüllt und mit einem Kork, der von einem dicken Glasrohr durchbohrt war, verschlossen. An das Glasrohr wurde ein 50 cm langes Kautschukrohr und an dieses ein großes Klystierrohr gesteckt.

Will man nun die rectale Aethernarkose machen, so bekommt der Patient $1\frac{1}{2}$ —2 Stunden vor der Operation ein ausreinigendes Klystier von kaltem Wasser, und, nachdem Alles zur Operation vorbereitet ist, legt sich der Kranke bequem auf die Seite, das Klystierrohr wird dann hoch in den Mastdarm kinaufgesteckt, während man die Aetherflasche in eine Schüssel stellt, welche Wasser von 50° R. Wärme enthält. Sofort fängt der Aether zu kochen an (denn er kommt ja schon bei 35° C. zum Sieden) und entwickelt also unter sprudelndem Geräusch massenhaft feine Dämpfe, die von den Rectalgefäßen aufgenommen werden und den Kranken narkotisieren.

Es kommt das Stadium der Excitation und das Stadium der Toleranz gerade so gut zu Stande, wie bei der Narkose durch den Mund. Es dauert eben auch 5—7 Minuten, bis ein Stadium der Toleranz kommt, das zum Operiren taugt.

Beide in der von Nufsbaum'schen Klinik gemachte Narkosen verliefen sehr schön: Einer 30jährigen Frau wurden mehrere Drainagen durch die eiternde Brust gezogen, und einem jungen Manne wurde ein fungös entartetes Gelenk aus-

gekratzt. Beides wurde von Geh. von Nufsbaum schmerzlos vollendet.

Weder während der Narkose noch nach dem Erwachen stellten sich die geringsten üblen Zufälle ein. Hiegegen wurde einige Tage später dieselbe Narkose wieder angewandt und sofort nach dem Beginn der Dämpfeinleitung klagte die betreffende Frau über heftige Kolikschmerzen und hörte man starkes Gurren im Leibe.

Da diese üblen Zufälle den gelungenen ersten 2 Fällen gegenüber recht auffallend waren, forschte man nach der Ursache, wobei sich herausstellte, dafs diese Patientin das reinigende Clysmä gar zu kurz vor der Narkose erhalten hatte.

Es war dieser Grund um so glaubbarer, als weitere Narkosen, wobei man auf diesen Punkt gehörig Rücksicht genommen hatte, wieder recht ordentlich verliefen.

Diese Narkose wurde schon früher in Kopenhagen gemacht. Dr. Axel Yverfen in Kopenhagen erfand eine Narkose per Rectum, welche in Fällen, wo wir an Mund und Nase operiren, sehr nützlich erscheint. Nur bei Operationen am Mastdarm selbst ist die rectale Aethernarkose nicht zu verwenden. Ja es ist überhaupt den Kranken sehr angenehm, Mund und Nase frei zu haben, keinen scharfen, üblen Geruch zu spüren.

In Frankreich machte sie zuerst nach Dr. Mollière zu Lyon und veröffentlichte schöne gelungene Fälle. Allein die Société medical und die Société de Biologie kritisirten die Sache sehr übel, obwohl sie gar keine Gründe für ihr schlechtes Urtheil beibrachten. Man erklärte diese Methode für gefährlich und unnütz.

Die Narkose verläuft aber thatsächlich sehr ruhig und jene Asphyxie, jenes Erbrechen, das man so oft nach Verabreichung durch den Mund sieht, tritt höchst selten und höchst gelinde ein. Bei Operationen im Munde oder in der Nase ist diese Applicationsweise äufserst vortheilhaft. Obwohl diese

Methode nun doch von ihrem Erfinder ziemlich häufig angewandt wurde, ist ein einziger unangenehmer Verlauf bekannt geworden; nemlich Dr. Delore, Chirurg zu Lyon, richtete einer sehr kräftigen Frau eine veraltete Luxation während einer solchen rectalen Narkose ein. Es ging die Operation sehr gut vorbei, aber die massenhafte Ansammlung von Aetherdämpfen im Darne hatte eine Kolik hervorgebracht, welche aber rasch wieder verschwand, wie die Aetherdämpfe mit Geräusch entwichen waren.

Während dieser länger dauernden Narkose soll es nun auch einmal zu einem kurzen Stillstand der Respiration gekommen sein, jedoch Alles bald wieder ordentlich fortgegangen sein.

Nach Allem, was man über diese rectale Narkose las, hörte und selbst erlebte, hätte sie wohl bei den Pariser Aerzten eine bessere Aufnahme verdient, als sie fand.

Zu bemerken dürfte sein, daß in viel früherer Zeit schon Aetherklyftiere zur Narkose angewendet wurden, und einige Autoren wollen sogar davon günstige Erfolge gesehen haben.

III.

Allgemeine Anaesthesie durch Stickstoffoxydul.

($N_2 O$).

Ein anderes, vielfach in Anwendung befindliches Narcoticum ist das Stickstoffoxydul, auch Stickoxydul, Luftgas oder Lachgas genannt. Es ist ein farbloses Gas, riecht und schmeckt schwach süßlich, hat ein spez. Gewicht von 1,52 und unterhält die Verbrennung fast ebenso intensiv, wie Sauerstoff.

Nach den Untersuchungen des englischen Stickoxydul-comités (Frankland und Coleman) ist es wahrscheinlich, daß das bei Inhalationen vom Blute absorbirte $N_2 O$ nicht zersetzt und unverändert wieder ausgeschieden wird. Nach Hermann geschieht die Ausscheidung größtentheils durch die Lungen. Man hat sich die rauschähnliche Wirkung des Gases so zu

denken, daß daselbe, dem Hirn durch die Circulation zugeführt, materielle Veränderungen dieses Organs auslöst, die nicht näher gekannt, aber wegen der kurzen Dauer der Funktionsstörung jedenfalls nicht eingreifender Natur sind.

Bei Einathmung eines Stickoxydulfauerstoffgemisches (4:1) treten nach Hermann folgende Erscheinungen auf:

Brausen und Trommeln in den Ohren, Undeutlichwerden der Gesichtswahrnehmungen, erhöhtes Wärmegefühl, ein Riefeln und ein Gefühl großer Leichtigkeit im ganzen Körper, die intendirten Bewegungen werden ziemlich maßlos, aus kleinen Muskelbewegungen wird ein läppisches Hin- und Herfahren, das Stehen wird schwankend, man stampft mit den Füßen, beim Sitzen Hin- und Herschaukeln. Die Empfindlichkeit ist etwas herabgesetzt. Der Ideengang ist abnorm schwunghaft, gewöhnlich heiter, (oft lautes Lachen und Jauchzen). Das Bewußtsein schwindet nie vollständig, ebenfowenig tritt vollkommene Anästhesie ein.

Außer schnell vorübergehender Schläfrigkeit keine Nachleiden. Während des Rausches zeigt sich geringe Pulsbeschleunigung, Injektion des Gesichts und der Conjunctiva, Erweiterung der Pupillen.

Menschen, die reines Gas einathmen, werden nach Hermann rasch in den eben beschriebenen Rauschzustand versetzt, zugleich aber werden die Athmungen dyspnoisch. Die Benommenheit geht in vollständige Bewußtlosigkeit über, das Gesicht wird leichenblau, die Schleimhäute livide, und es würden unzweifelhaft Convulsionen und Erstickung eintreten, wenn nicht schnell wieder Luft zugeführt würde, wodurch schnelle Wiederherstellung erfolgt. Das Erstickungsgefühl fehlt wegen des Rausches.

Mit diesen Angaben stimmen auch die Erfahrungen der Zahnärzte so ziemlich überein. Während die meisten Kranken die Gaseinathmung leicht und angenehm finden, klagen doch manche über ein zusammen schnürendes, beängstigendes Gefühl

auf der Brust, die Träume sind nicht immer heiterer, sondern zuweilen beängstigender Natur, convulsivisches Zittern vor Eintritt der Narkose wird häufig beobachtet, bei länger dauernden Inhalationen findet man das arterielle Blut schwarz. Sexuelle Erregungen sollen sehr häufig sein, Erbrechen und Ueblichkeit dagegen kommen fast nie vor, und nach dem Erwachen bleibt nur selten leichte Eingenommenheit des Kopfes für kurze Zeit zurück.

Anästhesie, die für kleine Operationen hinreicht, tritt gewöhnlich schon nach 50—60 Sekunden mit Nachlaß der Muskelspannung und schnarchendem Athem ein, soferne reines Gas eingeathmet wird. Ueble Zufälle sind auch bei Anwendung des Stickoxyduls als Anästhetikum gesehen worden, aber verhältnißmäßig sehr selten. Schon aus der physiologischen Wirkung geht hervor, daß das Stickoxydul im Allgemeinen nur für kurz dauernde Operationen, wie Zahnextraction, Abscessöffnung, Reduction von Luxationen etc. verwendet werden darf, und es ist deshalb bis heute hauptsächlich das Anästhetikum der Zahnärzte geblieben.

Es werden noch eine Reihe anderer Präparate und Gase zur Narkose benützt, aber im Vergleich zu den oben angeführten so selten und ohne besondere Eigenthümlichkeit, daß hier derselben nicht weiter erwähnt werden soll.

Das Amylen, die Kohlenäure, der Aether anaestheticus, das Methylbichlorid, und andere hatten bisher nur sehr vereinzelte oder vorübergehende Anwendung gefunden. Letzteres allein von Spencer Wells kräftigst empfohlen, scheint eine bedeutendere Zukunft zu haben, ist aber gegenwärtig noch recht wenig versucht worden.
